

同類藥物全球銷量第一<sup>1\*</sup>



## 凝血通™ (Eliquis™) 是什麼？

凝血通™ (Eliquis™) (醫學名稱: Apixaban 阿哌沙班) 是凝血因子Xa抑制劑，屬於新一代抗凝血藥，又常名為非維他命K拮抗劑類口服抗凝血藥 (Non-vitamin K antagonist oral anticoagulant – NOAC) 或直接口服抗凝血藥 (Direct oral anticoagulant – DOAC)<sup>2,3</sup>。

## 凝血通™ (Eliquis™) 與傳統抗凝血藥華法林比較

### 1. 功效更優勝、安全性更佳<sup>4</sup>



在功效和安全性同時優於華法林的新一代抗凝血藥<sup>5</sup>



在ARISTOTLE臨床研究中證明凝血通™ (Eliquis™) 減低主要出血風險約三成



唯一不增加腸道出血風險的凝血因子Xa抑制劑<sup>5</sup>

### 2. 服用凝血通™ (Eliquis™) 較傳統抗凝血藥更方便<sup>5-7</sup>

|            | 新一代抗凝血藥<br>凝血通™ (Eliquis™) | 傳統抗凝血藥<br>維他命K拮抗劑         |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 與食物相沖      | 不需要特別戒口 <sup>7</sup>       | 需要戒口 <sup>6</sup>         |
| 經常驗血檢查     | 不需要 <sup>5</sup>           | 需要 <sup>5</sup>           |
| 需要經常調較藥物劑量 | 不需要 <sup>7</sup>           | 需要，而且劑量要精準控制 <sup>6</sup> |


## 歐洲心臟學會及美國心臟學會建議指引<sup>5,8</sup>

- CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc風險因素評分為2分或以上的男性患者及3分或以上的女性患者，建議服用抗凝血藥減低風險。
- CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc風險因素評分為1分或以上的男性患者及2分或以上的女性患者，應考慮服用抗凝血藥減低風險。
- 相較傳統抗凝血藥維他命K拮抗劑，排除兩類不適用新一代抗凝血藥病人<sup>†</sup>，其餘均建議以新藥為優先選擇。

<sup>†</sup>中度至嚴重二尖瓣狹窄及裝有機械心臟瓣膜的病人

## 如何服用凝血通™ (Eliquis™)<sup>2,9</sup>

按醫生指示劑量，早晚各服藥一次，和水吞服，建議每天安排固定時間服用



- 可空腹或飽肚服用
- 若有漏服，請在記起時立刻補服，並繼續按原定時間服用，切忌服用雙倍劑量
- 須謹遵醫囑定時服用，切忌自行停藥和過量服用

## 注意事項

凝血通™(Eliquis™)或其他抗凝血藥的成效和出血風險都各有不同，患者應與醫生商討，了解當中差異選擇最合適的藥物，並按照醫生指示定時服藥，才可獲得最大效益。



凝血通™(Eliquis™)的腎臟排除比例為27%，為同類藥物最低<sup>5</sup>。醫生可能須因應患者的腎功能來調節不同抗凝血藥的劑量。



如需進行任何類型手術，包括內窺鏡檢查、牙齒護理（如脫牙）、白內障及青光眼手術，請告知醫生您正在服用凝血通™(Eliquis™)，再按照醫生指示，在手術前停止服藥及在手術後恢復服藥<sup>2,7</sup>。

\*與其他新一代抗凝血藥相比，全球處方凝血通™(Eliquis™)的患者治療天數更多。患者治療天數根據IQVIA MIDAS 2019 Q2商品銷售給零售商和經銷商的數據估算。

**References:** 1. IQVIA MIDAS, Days of Treatment volume a calculation of IQVIA Standard Units, Q2 2019, divided by recommended administration of each NOAC within 24hrs. [apixaban BID, dabigatran BID, edoxaban QD, rivaroxaban QD] 2. ELIQUIS™ (apixaban) 2.5 mg & 5 mg HK Prescribing Information. July 2019. 3. Almarshad F, et al. *Am J Blood Res* 2018;8:57-72. 4. Granger CB, et al. *N Engl J Med* 2011;365:981-992. 5. Kirchhof P, et al. *Eur Heart J* 2016;37:2893-2962. 6. MedlinePlus. Warfarin. Available at: [medlineplus.gov/druginfo/meds/a682277.html](https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682277.html). Accessed Mar 2020. 7. Steffel J, et al. *Eur Heart J* 2018; 39:1330-1393. 8. January CT, et al. *Circulation* 2019;140:e125-e151. 9. Anticoagulation UK. Oral anticoagulation fact sheet - Apixaban (Eliquis). Available at: [anticoagulationuk.org/admin/resources/downloads/apixaban-factsheet.pdf](https://anticoagulationuk.org/admin/resources/downloads/apixaban-factsheet.pdf). Accessed Jun 2020.

本小冊子內容僅供參考，凝血通™(Eliquis™)乃醫生處方藥物。藥物的成效和副作用可能因使用者的身體狀況及個別症狀而有所不同，詳情請向醫生或藥劑師查詢。

美國輝瑞科研製藥  
香港鰂魚涌英皇道683號嘉里中心18樓  
電話：2811 9711  
網站：[www.pfizer.com.hk](http://www.pfizer.com.hk)

PP-ELI-HKG-0329 AUG 2020

